




# Lăstun de mal

*Riparia riparia* (rândunele)

L 12 cm AA 27-29 cm Pasăre migratoare pe distanțe lungi

**Răspândire** Clocește în pereții abrupti de nisip, de obicei pe țărmuri sau coaste. Caută hrana în zonele deschise din jur.

- > Perioada de cuibărit aprilie-septembrie
- > 4-6 ouă de un alb pur
- > 1-2 ponte pe an



Lăstunul de mal cuibărește de obicei în colonii. Își construiește galeriile de cuibărit în puținii pereți abrupti existenți în peisaj. Câteva mii de perechi alcătuiesc cele mai mari colonii de pe țărmurile abrupte ale Mării Baltice. Acest mod de cuibărit are avantajul că mamiferele prădătoare, cum ar fi bursucii sau vulpile, nu pot ajunge la cuiburi. În schimb, nisipul care alunecă poate pune în pericol puii. Lăstunul de mal este gregar și în timpul migrației și la reședința africană de iarnă.



gâtul alb

dungă maro pe piept

18



partea superioară maro

coada ușor despăcată



colonie de cuibărit

**Vocea** În zbor, sunete aspre, ca de tors („țșrrrt”). Cântec sporovăit, care nu iese în evidență.

## Știați că?

Masculul sapă cu ghearele o galerie de cuibărit de 90 cm adâncime în nisip, în timp de una până la două săptămâni. La sfârșit, căptușește camera de cuibărit cu iarbă și pene. Amândoi partenerii se ocupă în comun de clocit și de hrănirea puilor.

